

ПОЛИОМИЕЛИТ



Острое инфекционное заболевание с поражением нервной системы (спиной мозг). Полиомиелитом болеют, в основном, дети в возрасте до пяти лет.

Возбудитель – вирус.

Источник заражения: больной человек.

Путь передачи: фекально-оральный при употреблении загрязненной воды и пищевых продуктов, реже воздушно-

капельный. Вирус попадает в организм через рот и размножается в кишечнике, попадает в кровь, распространяясь по организму в органы и ткани: лимфоузлы, селезенку, печень, легкие, сердечную мышцу. В дальнейшем вирус проникает в центральную нервную систему.

Инкубационный период. От 4 до 35 дней (в среднем 7-14 дней)

Клиническая картина. Полиомиелит с поражением ЦНС чаще проявляется в виде серозного менингита: высокая температура, усталость, головная боль, тошнота, ригидность мышц шеи. Паралитическая форма встречается только у непривитых или не полностью вакцинированных и характеризуется развитием парезов и параличей. Параличи периферические, вялые, с низким тонусом мышц, снижением или исчезновением сухожильных рефлексов и последующей атрофией мышц

Лечение. Специфического лечения полиомиелита нет. Больной подлежит обязательной изоляции на срок не менее 3 недель. При паралитических формах полиомиелита лечение длительное и зависит от периода болезни.

Осложнения: острая дыхательная недостаточность, сколиоз, атрофия мышц.

Профилактика. 1-я вакцинация ребенка проводится в 3 мес., 2-я - в 4,5 мес., 3-я - в 6 мес., 1-я ревакцинация в 18 мес., 2-я - в 20 мес., 3-я - в 6 лет, в соответствии с Национальным календарем прививок.

С профилактической целью важно проводить регулярное проветривание помещения, влажную уборку дома. Необходимо иметь личное полотенце, постельное белье, посуду, мыть руки перед едой, употреблять воду из проверенных источников, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением





В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ КАЛЕНДАРЁМ ПРИВИВОК ВАКЦИНАЦИЯ РЕБЁНКА ПРОВОДИТСЯ:

- первая в 3 мес
- вторая — 4,5 мес
- третья — 6 мес

Ревакцинация:

- первая в 18 мес
- вторая — 20 мес
- третья — 6 лет





У непривитых или не полностью
вакцинированных встречается
только **паралитическая форма с
развитием парезов и параличей**





Неспецифическая профилактика:

- регулярное проветривание помещения, влажная уборка дома
- соблюдение личной гигиены — личное полотенце, постельное бельё, посуда
- мытьё рук перед едой
- употребление воды из проверенных источников
- тщательное мытьё овощей и фруктов перед употреблением





Полиомиелит — острое инфекционное заболевание с поражением нервной системы (спинной мозг).

Путь передачи:

- фекально-оральный при употреблении загрязнённых пищевых продуктов и воды
- воздушно-капельный

Возбудитель – вирус. Источник заражения — больной человек. Болеют в основном дети в возрасте до пяти лет.

Специфического лечения полиомиелита нет, заболевание можно только предотвратить. ПРОФИЛАКТИКА – ВАКЦИНАЦИЯ.



Городской центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики



Поделись информацией
с друзьями и близкими

